

LOS DESEOS DE INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES CON CÁNCER AVANZADO Y LAS VARIABLES ASOCIADAS.

Navarro Jimenez, J. M., Cruzado Rodriguez, J. A., Dominguez Cruz A., Garcia Garcia, B., Honrado Lopez, Y. y Boya Cristia, M. J.

(1) Psicólogo. Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz. josemiguel.navarro@aecc.es

INTRODUCCIÓN

Estar informados ayuda a los pacientes oncológicos en fase avanzada a participar en la toma de decisiones sobre los tratamientos, a planificar el futuro y a prepararse para la muerte. Los pacientes oncológicos tienen el derecho de recibir la información que deseen, el medico la obligación ética y legal de comunicársela, y de forma conjunta han de decidir un plan de cuidados respetando las preferencias del paciente.

La mayoría de los pacientes desean recibir información en mayor o menor medida. El cumplimiento de los deseos de información que tienen los pacientes es prioritario en la búsqueda de una óptima calidad asistencial.

OBJETIVO

Conocer los deseos de información que tienen los pacientes con cáncer avanzado y las variables asociadas.

MUESTRA

90 pacientes con cáncer avanzado atendidos por el Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Getafe.

DISEÑO

Es un estudio correlacional y transversal (aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario de Getafe).

PROCEDIMIENTO

Recogida de datos a través de una entrevista las variables de deseo de información, las sociodemográficas y las psicoafectivas de las personas con cáncer avanzado.

CONCLUSIONES

- ✓ Necesidad de valorar la información y los deseos que tienen los pacientes de forma individualizada y en las diferentes variables de información.
- ✓ Existe un déficit de información sobre la curación, el objetivo del tratamiento y el final de vida.
- ✓ Un alto porcentaje de pacientes desearían recibir información y no la reciben. Los pacientes más jóvenes, con pareja y no religiosos son los que más desean recibir información.

RESULTADOS

El 77,8% de los pacientes no informados, deseaban conocer el diagnóstico, el 60,0% la gravedad, el 77,8% el objetivo del tratamiento, el 76,7 la curación y un 34,4 el final de vida.

